# INTERACTIES MET RISICO OP MAAGSCHADE




**RICHTLIJN RIZIV:**

AFHANDELING

**NSAID** **+**

| 1 van de volgende risicofactoren aanwezig: |
|---|
| voorgeschiedenis van peptisch ulcus |
| leeftijd > 70 jaar |
| gebruik van anti-aggregantia of **anticoagulantia** |
| systemisch gebruik van corticosteroïden |
| ernstige cardiovasculaire comorbiditeit |

**PPI in standaarddosering toevoegen voor duur inname NSAID**

VOORBEELD

**Brufen® + Marcoumar®**

RISICO & ERNST

**RISICOFACTOREN VOOR MAAGSCHADE BIJ GEBRUIK NSAID**

LEEFTIJD:

> 70 jaar !

COMORBIDITEIT:

- cardiovasculair: hartfalen – diabetes mellitus - ernstige invaliderende reumatoïde artritis
- voorgeschiedenis van peptisch ulcus !

ANTI-AGGREGANTIA OF ANTICOAGULANTIA:

- Coumarines
- P2Y12-remmers
- Laaggedoseerde salicylaten
- DOAC's !

SYSTEMISCHE CORTICO'S:

- oraal
- intra-articulair
- intraveneus !

ANDERE GENEESMIDDELEN:

- SSRI, SNRI, tradozon
- Spironolacton
- bisfosfonaten

DOSIS:

dosis > DDD

GELIJKAARDIG

**ASA als anti-aggregans** **+**

| 1 van de volgende risicofactoren aanwezig: |
|---|
| voorgeschiedenis van peptisch ulcus |
| leeftijd > 80 jaar |
| gebruik van anti-aggregantia of anticoagulantia |
| systemisch gebruik van corticosteroïden |

**PPI in standaarddosering toevoegen voor duur inname ASA**