

INNAME VAN GENEESMIDDELEN (alfabetisch)							
stofnaam	voorbeeld specialiteit	inname-moment: Ochtend / Middag / Avond	t.o.v. de maaltijd	combinatie met			extra advies
				melk	alcohol	pompelmoes	
ACENOUCOUMAROL	SINTROM	A					
ALENDRONAAT	FOSAMAX	O	30' voor	☹			veel drinken. Rechtstaand of zittend. Niet liggen binnen 30 min na inname Interval met andere medicatie: 30 min
ALENDRONAAT MET VIT D	FOSAVANCE	O	30' voor	☹			veel drinken. Rechtstaand of zittend.
ALLOPURINOL	ZYLORIC		vlak na				veel drinken
ALTIZIDE	ALDACTAZINE	O of A 18u	bij of buiten				veel drinken, traag rechtstaan
AMIODARONE	CORDARONE	zelfde tijdstip	bij of vlak na				veel drinken
AMITRIPTYLINE	REDOMEX	A	bij of buiten				
AMLODIPINE	AMLOR	zelfde tijdstip	bij of buiten			☹	
AMOXICILLINE	CLAMOXYL	spreiden	bij				veel drinken
ATENOLOL	TENORMIN	zelfde tijdstip	bij of buiten				
ATORVASTATINE	LIPITOR	zelfde tijdstip	bij of buiten			☹	
BETAHISTINE	BETASERC	spreiden	bij				
BIPERIDEEN-HYDROCHLORIDE	AKINETON	spreiden	bij of na				veel drinken
BISOPROLOL-FUMARAAT	EMCONCOR	zelfde tijdstip	bij of buiten				
BUDESONIDE	PULMICORT						
BISOPROLOL-FUMARAAT	ISOTEN	zelfde tijdstip	bij of buiten				
BUMETANIDE	BURINEX	O of A 18u	bij				veel drinken en traag rechtstaan
CANDESARTAN	ATACAND	zelfde tijdstip	bij of buiten				
CAPTOPRIL	CAPOTEN	zelfde tijdstip	bij of buiten				1ste week: liggen na inname
CARBAMAZEPINE	TEGRETOL	spreiden	na of buiten		☹	☹	
CARVEDILOL	KREDEX	zelfde tijdstip	bij of buiten				1ste week: liggen na inname
CEFADROXIL	DURACEF	spreiden	bij				veel drinken
CEFUROXIM	ZINNAT	spreiden	30' na				veel drinken
CITALOPRAM	CIPRAMIL	A	bij of buiten		☹		veel drinken

INNAME VAN GENEESMIDDELEN (alfabetisch)							
stofnaam	voorbeeld specialiteit	inname-moment: Ochtend / Middag / Avond	t.o.v. de maaltijd	combinatie met			extra advies
				melk	alcohol	pompelmoes	
CLARITHROMYCINE	BICLAR	spreiden	bij				veel drinken
CLOMETOCILLINE	RIXAPEN	spreiden	bij				veel drinken
CLOPIDOGREL	PLAVIX	zelfde tijdstip	bij of buiten				
COLCHICINE	COLCHICINE		bij of na				
DESLORATADINE	AERIUS	zelfde tijdstip	bij of buiten				
DEXTRO-METHORFAN-HBR	TOUXIUM, TUSO-RHINATHIOL, HUMEX, ACTIEFD	spreiden	na				
DICLOFENAC	VOLTAREN	spreiden	voor				veel drinken niet liggend innemen
DIGOXINE	DIGOXINE	zelfde tijdstip	bij				
DILTIAZEM	TILDIEM	zelfde tijdstip	buiten			⊗	
DIPYRIDAMOL + ACETYLSALICYLZUUR	AGGRENOX	O + A 18u	bij				
DONEPEZIL	ARICEPT	A voor slapen	buiten				
DOXYCYCLINE	DOXYCYCLINE	spreiden	bij of buiten	⊗			veel drinken. Niet liggend innemen. Eerste 30 min na inname niet gaan liggen
ENALAPRIL	RENITEC	zelfde tijdstip	bij of buiten				1ste week: liggen na inname
ENOXAPARINE	CLEXANE	zelfde tijdstip					subcutaan
ESCITALOPRAM	SIPRALEXA	zelfde tijdstip	buiten		⊗		
ESTRIOL	AACIFEMINE	zelfde tijdstip	bij of buiten				veel drinken
FELODIPINE	PLENDIL	O	bij of buiten		⊗	⊗	
FELODIPINE	RENEDIL	O	bij of buiten			⊗	
FENOFIBRAAT	LIPANTHYL	A 18u	bij				veel drinken
FENPROCOUMON	MARCOUMAR	A	bij of buiten				
FENTANYL	DUROGESIC				⊗		aanbrengen op niet geïrriteerde huid - Max. 72u

INNAME VAN GENEESMIDDELEN (alfabetisch)							
stofnaam	voorbeeld specialiteit	inname-moment: Ochtend / Middag / Avond	t.o.v. de maaltijd	combinatie met			extra advies
				melk	alcohol	pompelmoes	
FENYTOINE NA	DIPHANTOINE	spreiden	bij				
FLUCLOXACILLINE	FLOXAPEN	spreiden	1u voor				veel drinken
FLUOXETINE	FLUOXETINE	O of A	bij of buiten				
FOSFOMYCINE	MONURIL	O nuchter of A voor slapen	buiten				na plassen 1 zakje in een glas water oplossen en opdrinken
FUROSEMIDE	LASIX	O of A 18u	bij				veel drinken traag rechtstaan
GALANTAMINE HBR	REMINYL	O of A 18u	bij				
GLICLAZIDE	DIAMICRON	O of A	bij		⊗		
GLIMEPIRIDE	AMARYLLE	O + A					
GLIQUIDON	GLURENORM	O + A	bij				
HALOPERIDOL	HALDOL	spreiden	bij of buiten		⊗		1ste week: gaan liggen na inname
IBUPROFEN	BRUFEN, NUROFEN	spreiden	1u voor				veel drinken niet liggend innemen
IJZERGLUCONAAT, ASCORBINEZUUR	LOSFERRON	O	30' voor				
INDAPAMIDE	FLUDEX	O of A	bij of buiten				veel drinken en traag rechtstaan
IPRATROPIUM-BROMIDE	ATROVENT						
IPRATROPIUM, FENOTEROL	DUOVENT						acuut : 2 puffs, te herhalen indien nodig na 5 min
IRBESARTAN	APROVEL	zelfde tijdstip	bij of buiten				
ISOSORBIDEDI-NITRAAT	CEDOCARD				⊗		chronisch: inname 30 min voor de maaltijd of 1 u na de maaltijd onder de tong zittend of liggend Acuut: inname bij aanval
LERCANIDIPINE HCl	ZANIDIP	zelfde tijdstip	15' voor			⊗	
LEVIDOPA, BENSERAZIDE	PROLOPA	spreiden	buiten of bij lichte		⊗		oplosbare tabletten: groot glas water
LEVOCETIRIZINE	XYZALL	zelfde tijdstip	voor of na				

INNAME VAN GENEESMIDDELEN (alfabetisch)							
stofnaam	voorbeeld specialiteit	inname-moment: Ochtend / Middag / Avond	t.o.v. de maaltijd	combinatie met			extra advies
				melk	alcohol	pompelmoes	
LEVODOPA CARBIDOPA ENTACAPONE	STALEVO	O	buiten of bij lichte				
LEVOTHYROXINE	ELTHYRONE	O	30' voor	⊗			
LEVOTHYROXINE	L-THYROXINE	O	30' voor	⊗			
LISINOPRIL	ZESTRIL	zelfde tijdstip	bij of buiten				1ste week: liggen na inname
LORAZEPAM	TEMESTA	spreiden	bij of buiten		⊗	⊗	
LOSARTAN KALIUM	COZAAR	zelfde tijdstip	bij of buiten			⊗	
MELOXICAM	MOBIC		bij		⊗		veel drinken niet liggend innemen
METFORMINE HCL	METFORMAX, GLUCOPHAGE		bij of vlak na		⊗		
METHYL-PREDNISOLON	MEDROL	O	bij of buiten			⊗	
METHYL-PREDNISOLON	SOLU-MEDROL						Inspuiting iv of im
METOPROLOL SUCCINAAT	SELOZOK	O	bij				
METOPROLOL TARTRAAT	SELOKEN	zelfde tijdstip	bij				
METYLDIGOXINE	LANITOP	zelfde tijdstip	bij				
MIRTAZAPINE	REMERGON	O en/of A	bij of buiten				Soltab: op tong laten smelten en inslikken met of zonder water
MOLSIDOMINE	CORUNO	O	bij				
MOMETASON-FUROAAT	NASONEX						inademen via neus, uitademen via mond Schudden voor gebruik Max 2 x 2 verstuiwingen in elk neusgat/dag
MORFINESULFAAT	MS CONTIN	spreiden (12u interval)	bij of buiten		⊗		
MORFINESULFAAT	MS DIRECT	spreiden (12u interval)	bij of buiten				
MOXIFLOXACINE	AVELOX	spreiden	bij of buiten				
MOXIFLOXACINE	PROLOX	spreiden	bij of buiten				

INNAME VAN GENEESMIDDELEN (alfabetisch)							
stofnaam	voorbeeld specialiteit	inname-moment: Ochtend / Middag / Avond	t.o.v. de maaltijd	combinatie met			extra advies
				melk	alcohol	pompelmoes	
MOXONIDINE	MOXON	zelfde tijdstip	bij of buiten		⊗		
NADROPARINE CA	FRAXIPARINE						1 inspuiting/dag subcutaan
NADROPARINE CA	FRAXODI						1 inspuiting/dag subcutaan
NATRIUM RESIDRONAAT	ACTONEL WEKELIJKS	O	30' voor	⊗			1 tablet/week zelfde dag van de week veel drinken rechtstaand of zittend niet liggen binnen 30 min na inname interval met andere medicatie: 30 mi
NEBIVOLOL	NOBITEN	zelfde tijdstip	bij of buiten				traag van liggend naar staand
NIFEDIPINE	ADALAT OROS	O	bij of buiten		⊗	⊗	
NIFURTOÏNOL	URFADYN PL	O + A	bij of met melk/yoghurt				veel drinken
NITROGLYCERINE	MINITRAN		aanbrengen TTS				
OFLOXACINE	TARIVID	O	bij of buiten				veel drinken
OLANZAPINE	ZYPREXA	zelfde tijdstip	bij of buiten		⊗		
OMEPRAZOL	LOSEC	O	voor		⊗		veel drinken bij slikproblemen: Niet kauwen of stuk breken, wel comprimés uiteen laten vallen in water en oplossing binnen 30 min opdrinken
OTILONIUM-BROMIDE	SPASMOMEN	spreiden	20' voor				veel drinken
OXYBUTININE	DITROPAN	spreiden					
PANTOPRAZOL NA	PANTOZOL	O	1u voor		⊗		veel drinken niet kauwen of stuk breken
PAROXETINE	SEROXAT	O	bij		⊗		
PERINDOPRIL	COVERSYL	zelfde tijdstip	bij of buiten				1ste week: liggen na inname
PIPAMPERON	DIPIPERON	spreiden	bij of buiten				druppels innemen met zoete drank (geen alcohol)
PIROXICAM	BREXINE		bij				veel drinken niet liggend innemen
PIROXICAM	FELDENE		bij				veel drinken niet liggend innemen

INNAME VAN GENEESMIDDELEN (alfabetisch)							
stofnaam	voorbeeld specialiteit	inname-moment: Ochtend / Middag / Avond	t.o.v. de maaltijd	combinatie met			extra advies
				melk	alcohol	pompelmoes	
PRAVASTATINE	PRAVASINE	A	bij			☹	
PROPRANOLOL	INDERAL	zelfde tijdstip	voor				
PROTHIPENDYL HCL	DOMINAL	spreiden	na				
QUINAPRIL	ACCUPRIL	zelfde tijdstip	bij of buiten				veel drinken 1ste week: liggen na inname
RABEPRAZOL NA	PARIET	O	voor		☹		veel drinken niet kauwen of stuk breken
RAMIPRIL	TRITACE	zelfde tijdstip	bij of buiten				veel drinken 1ste week: liggen na inname
RANITIDINE	ZANTAC	O + A	1u voor of 2u na				veel drinken
REPAGLINIDE	NOVONORM	O of A	kort voor				
RISPERIDON	RISPERDAL	spreiden	bij of buiten		☹		
ROSUVASTATINE	CRESTOR	zelfde tijdstip	bij of buiten			☹	
SALBUTAMOL	VENTOLIN						
SERTRALINE	SERLAIN		bij of buiten		☹		
SIMVASTATINE	ZOCOR	A	bij			☹	
SOTALOL	SOTALEX	zelfde tijdstip	1u voor of 2u				
SULPIRIDE	DOGMATIL	spreiden	bij of buiten				
TERAZOSINE	HYTRIN	voor slapen	buiten				
THIAMAZOL	STRUMAZOL	spreiden					
TRAMADOL	CONTRAMAL, TRADONAL	spreiden	bij of buiten		☹		veel drinken
TRAMADOL + PARACETAMOL	ZALDIAR	spreiden (6u interval)	bij of buiten				
TRAZODON HCL	TRAZOLAN	A	bij of buiten				
VALPROAAT NA	DEPAKINE	spreiden	bij		☹		
VALSARTAN	DIOVANE	zelfde tijdstip	bij of buiten				
VENLAFAXINE	EFEXOR EXEL	zelfde tijdstip	bij		☹		
ZOLPIDEM	STILNOCT	voor slapen					